



Berenil®

*Para el tratamiento de
Babesiosis y Tripanosomosis*

**RESPALDO DE MARCA QUE
GARANTIZA DESARROLLO,
INVESTIGACIÓN Y EFECTIVIDAD
DEL PRODUCTO**

COMPOSICIÓN

Solución inyectable

**Diaminazina aceturato:
70 mg por 1 mL**

Presentación:
Frasco de 20 mL





¿CUÁLES SON LAS **VENTAJAS** DE LA COMPOSICIÓN?



Efecto rápido, en **30 MINUTOS** ya se presentan manifestaciones degenerativas en todos los géneros de **BABESIA** y **TRIPANOSOMOSIS**.



Permite que los animales continúen con **DEFENSAS ORGÁNICAS CONTRA BABESIOSIS**.



CORTO PERÍODO DE RETIRO.

BENEFICIOS



MEDICAMENTO DE ELECCIÓN cuando no se conoce el género de **BABESIA** y en el tratamiento de **TRIPANOSOMA VIVAX**.




Buen margen de **SEGURIDAD**.
TOLERANCIA de hasta 5 veces la dosis

SOLUCIÓN LISTA PARA USO



PREVENTIVO PARA BABESIOSIS

DOSIS



Fuente: Cujíño, R; Patiño, F., 2000

VÍA DE APLICACIÓN Y DOSIS

**Dosis curativa
para Babesiosis y
Tripanosomosis:** 5 mL por
cada 100 Kg de peso vía
intramuscular.

**Dosis preventiva para
Babesiosis:** 5 mL por
cada 200 Kg de peso vía
intramuscular.





TIEMPO DE **RETIRO**

3 días en leche
20 días en carne



Berenil®

Para el tratamiento de Babesiosis y Tripanosomosis

**Respaldo de marca que garantiza desarrollo,
investigación y efectividad del producto**



En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com

*Este material es válido para uso en Centro América y Caribe.