



Finadyne[®]

POTENTE + EFICAZ + RÁPIDO



COMPOSICIÓN

Cada mL contiene **50 mg**
de **Flunixin meglumina**.





¿CUÁLES SON LAS **VENTAJAS** DE LA COMPOSICIÓN?



POTENCIA



RAPIDÉZ



EFICACIA



DURACIÓN



FLEXIBILIDAD: se puede
aplicar diariamente hasta
por 5 días.

CUADRO COMPARATIVO

Finadyne®

PRODUCTO	ANTIINFLAMATORIO	ANTIPIRÉTICO	ANALGÉSICO
Flunixin meglumine	● ●	●	● ●
Dipirona		●	● ●
Fenilbutazona	● ●	●	●
Ketoprofeno	●	●	●
Naproxeno	●	●	●
Meloxicam	●	●	●
Ac. Meclofenámico	●	●	●

Fuente: Cujíño, R., 2015

BENEFICIOS



Puede administrarse en animales de **CUALQUIER EDAD, ESTADO FISIOLÓGICO** e incluso en **HEMBRAS GESTANTES**

**NO CAUSA
ABORTOS**

ES SEGURO

**EVITA el shock
endotóxico en
mastitis y otras
infecciones**



**Favorece
una RÁPIDA
RECUPERACIÓN
PULMONAR**

**RETORNO
RÁPIDO A
PRODUCCIÓN**



VÍA DE APLICACIÓN Y DOSIS

SOLUCIÓN INYECTABLE

BOVINOS: 2 mL/45 Kg peso vivo por vía endovenosa lenta cada 24 horas hasta por 3 a 5 días o divididas en 2 dosis cada 12 horas.

EQUINOS: 1 mL cada 45 Kg de peso por vía endovenosa o intramuscular cada 24 horas hasta por 5 días. En cólicos se recomienda la vía endovenosa.





RECOMENDACIONES

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **7 días después de finalizado el tratamiento.**

La leche producida **durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo**, no debe destinarse al consumo humano.



TIEMPO DE RETIRO

Bovinos: Carne 7 días, leche 48 horas.

Equinos: No utilizar en animales destinados a consumo humano.



Finadyne®

Potente + Eficaz + Rápido



En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com

*Este material es válido para uso en Centro América y Caribe.