



MASTIJET® FORTE

MÁS LECHE DE CALIDAD

COMPOSICIÓN

Cada jeringa contiene:

Tetraciclina (HCl)	200 mg
Neomicina (sulfato)	250 mg
Bacitracina	2,000 U.I.
Prednisolona	10 mg
Excipiente, c.b.p. 8 g.	





¿CUÁLES SON LAS **VENTAJAS** DE LA COMPOSICIÓN?

- ✓ **SUSPENSIÓN INTRAMAMARIA** altamente sinérgica de amplio espectro con actividad antiflogística para el tratamiento de mastitis en lactancia.
- ✓ **TRATAMIENTO EFECTIVO** de casos graves de *Staphylococcus* y coliformes.
- ✓ **TRATAMIENTO CADA 24 HORAS.**

CUADRO COMPARATIVO



MASTIJET® FORTE presenta
MAYOR EFICACIA
contra las diferentes bacterias
causantes de mastitis.



BENEFICIOS



RÁPIDA TASA DE CURACIÓN CLÍNICA

debido a la combinación
antibiótica sinérgica y al poder
antiinflamatorio
de la prednisolona.

25 pruebas de campo conducidas por Médicos Veterinarios (mastitis clínica)

	Curación clínica		Curación bacteriológica %	
	N	%	N	%
<i>S. aureus</i>	26/27	96	21/27	78
<i>Step. spp</i>	44/54	81	44/54	81
<i>E. coli</i>	11/16	69	12/16	75
Total	81/97	83	77/97	79

MAYOR
%
DE CURACIÓN
CLÍNICA Y
BACTERIOLÓGICA



VÍA DE APLICACIÓN Y DOSIS

MASTIJET® FORTE

Una jeringa en el cuarto
afectado, repetir el
tratamiento cada 24 horas
durante 3 a 5 días.



RECOMENDACIONES

1

Desinfecte el pezón antes del tratamiento.

2

Agite bien antes de su uso.

3

Retire el tapón protector hasta el momento de la administración.

4

Conserve en un lugar fresco y seco.



La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo **no debe darse al consumo humano.**



MASTIJET® FORTE

Más leche de calidad



En caso de eventos adversos o farmacovigilancia reportarlo a: farmacovet@merck.com

*Este material es válido para uso en Centro América y Caribe.

